



## KAMILLIN EXTERN ROBUGEN

- ist ein **pflanzliches Arzneimittel** mit dem Wirkstoff **Kamillenblütenextrakt**.
- 100 g **KAMILLIN EXTERN ROBUGEN** enthalten die Wirkstoffe aus bis zu **50 g** Kamillenblüten mit Levomenol, Apigenin, Matricine, En-In-Dicycloether.
- Kamillenblütenextrakt wirkt als Antiphlogistikum entzündungshemmend und granulationsfördernd auf geschädigtes Zellgewebe der Haut.
- wird **äußerlich angewendet für feuchte Umschläge**, zu Waschungen oder Spülungen bei entzündlichen Haut- und Schleimhauterkrankungen (z. B. Ekzeme) und bakterieller Hauterkrankungen (Nachbehandlung offener Abszesse, eröffneter Furunkel und infizierter Wunden); bei Entzündungen im Analbereich und der Geschlechtsorgane.
- ist **zugelassen** und wird hergestellt aus **hochwertigen Kamillensorten aus kontrolliertem Anbau\***

M084193W ::

**\*Qualität aus Deutschland:** Um eine gleich bleibende Wirkung dieses Naturproduktes sicherzustellen, verwenden wir nur unsere geschützten Spezial-Kamillensorten, die unter unserer ständigen Kontrolle (in Thüringen) angebaut werden. Von der Selektion und Anzucht des Saatgutes, der Ernte der Kamillenblüten bis zur Extraktion (in Esslingen) überwachen wir die gesamte Produktion und den Kreislauf dieses Arzneimittels aus nachwachsenden Rohstoffen. Auf diese Weise können wir eine gleich bleibende optimale Zusammensetzung der Wirkstoffe in unseren Kamillenblüten und damit in unserem **KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN** sicherstellen.

**KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN Wirkstoff:** Kamillenblüten-Auszug. **Zusammensetzung:** 100 ml Flüssigkeit enthalten 94,2 g Auszug aus Kamillenblüten (1:2,0-2,8) Auszugsmittel: Propan-2-ol 48% (V/V). Die sonstigen Bestandteile sind Gereinigtes Wasser, Macrogollaurylether (Ph. Eur.) und Natriumhydroxid-Lösung 50% (m/m). **Anwendungsgebiete:**

**KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN** wird angewendet als Voll- und Teilbad bei Haut- und Schleimhautentzündungen, als Sitzbad bei entzündlichen Erkrankungen am Darmausgang, Afterjucken (Pruritus ani), nach Operationen, entzündlichen Erkrankungen im Bereich der äußeren Geschlechtsorgane, zur Nachbehandlung von Operationswunden in der Scheide und Scheidendammsschnitten (Episiotomien), zur Linderung der Beschwerden bei Hämorrhoiden, bei Ekzemen oder Einrissen am Darmausgang (analem und perianalem Ekzem, Analfissuren). **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Kamille oder andere Korbblütler (z.B. Beifuß) oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. Bei größeren Hautverletzungen und akuten unklaren Hauterkrankungen, bei schweren fieberhaften und infektiösen Erkrankungen, bei Herzmuskelschwäche oder bei Bluthochdruck sollen Vollbäder unabhängig vom Inhaltsstoff nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. **KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN** darf nicht im Bereich der Augen, zur Inhalation oder zu Darmspülungen verwendet werden. Bei fehlender Besserung innerhalb von 3 Tagen, großflächigen Entzündungen sowie bei Hinweisen auf bakterielle Infektionen (z. B. eitrig belegte Hautveränderungen) sollte ein Arzt aufgesucht werden. **Schwangerschaft und Stillzeit:** Aus der verbreiteten Anwendung von Kamille als Lebensmittel haben sich bisher keine Hinweise auf Risiken in Schwangerschaft und Stillzeit ergeben. Dies gilt auch für die äußerliche Anwendung. Ergebnisse experimenteller Untersuchungen liegen nicht vor. **KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN** sollte deshalb bei Schwangeren und in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. **Nebenwirkungen:** Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Kontaktallergien) auftreten, auch bei Personen mit Überempfindlichkeit gegen andere Korbblütler (z.B. Beifuß) wegen so genannter Kreuzreaktionen. Bei Auftreten von Nebenwirkungen ist die Anwendung von **KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN** zu beenden und ein Arzt aufzusuchen.

**Dosierung:** Umschläge, Spülungen und Waschungen: 1/2 Portionsbeutel (20 ml) auf 1 l Wasser ein- bis mehrmals täglich. Teil- und Sitzbad: 1/2-1 Portionsbeutel (20-40 ml) auf 20-40 l Wasser; Säuglings- und Kinderbad: 1/4- 1/2 Portionsbeutel (10-20 ml) auf 10-20 l Wasser; Vollbad: 2 Portionsbeutel (80 ml) auf 150 l Wasser jeweils einmal täglich. Badetemperatur: **KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN** in handwarmes (30-34°C) Wasser geben. Badedauer: 10-12 Minuten

**Packungsgrößen:** 240 ml (N1) mit 6 Portionsbeutel a 40 ml (PZN 0329272); 400 ml (N2) mit 10 Portionsbeutel a 40 ml (PZN 0329289) (PZN 0329295); 1000 ml (N3) mit 25 Portionsbeutel a 40 ml (PZN 0329303) **Zul. Nr. 6421397.00.00** **Stand der Information: November 2008 (6)**