



KORO NYHADIN® - Tabletten oder Tropfen

- sind rein pflanzliche Arzneimittel
- bei nachlassender Leistungsfähigkeit des Herzens (nach NYHA* II).
- Sie enthalten hochdosierte Extrakte aus Weißdornblättern mit Blüten (Crataegus),
- sind gut verträglich und sollten langfristig auf Dauer verabreicht werden.
- Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Herzpräparaten – auch im Falle von Überdosierungen – sind nicht bekannt.
- **KORO NYHADIN® - Tropfen** enthalten D-Campher (als Aroma), dieser erhöht durch eine erleichterte Atmung die Sauerstoffaufnahme und regt den Kreislauf an.

KORO NYHADIN® Tabletten / Tropfen enthalten hochdosierte Extrakte aus Weißdornblättern mit Blüten (*Crataegus oxycantha* L.). Weißdornextrakt fördert die Herzmuskeldurchblutung, steigert die myokardiale Kontraktionskraft (positiv inotrop), verkürzt die Reizleitungszeit (positiv dromotrop) und mindert gleichzeitig die Erregbarkeit des Herzmuskels (negativ bathmotrop). Die Senkung des peripheren Gefäßwiderstandes bewirkt eine Entlastung der Pumpleistung des Herzens, eine leichte Blutdrucksenkung und eine Besserung der subjektiven Beschwerden. Der in den **Tropfen** enthaltene natürliche D-Campher erhöht durch eine erleichterte Atmung (atemanaleptisch / bronchospasmolytisch) die Sauerstoffaufnahme und wirkt kreislauf-tonisierend.

KORO NYHADIN® Tropfen Wirkstoff: Trockenextrakt aus Weißdornblättern mit Blüten; **Zusammensetzung:** 100 g Flüssigkeit enthalten 25 g Trockenextrakt aus Weißdornblättern mit Blüten (DEV 4-7:1, Auszugsmittel: Ethanol 45 % V/V); D-Campher 0,5g. (Aromastoff), enthält 13%-vol Alkohol.

KORO NYHADIN® Filmtabletten Wirkstoff: Trockenextrakt aus Weißdornblättern mit Blüten; **Zusammensetzung:** 1 Tablette enthält 450 mg Trockenextrakt aus Weißdornblättern mit Blüten (DEV 4-7:1, Auszugsmittel: Ethanol 45 % V/V);

Anwendungsgebiete: Nachlassende Leistungsfähigkeit des Herzens entsprechend Stadium II nach NYHA *; Hinweis: Bei unverändertem Fortbestehen der Krankheitssymptome über sechs Wochen oder bei Ansammlung von Wasser in den Beinen ist eine Rücksprache mit dem Arzt zu empfehlen. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, oder bei Atemnot ist eine sofortige ärztliche Abklärung zwingend erforderlich. **Gegenanzeigen:** Keine bekannt; Schwangerschaft und Stillzeit: Aus der verbreiteten Anwendung von Weißdorn als Arzneimittel haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken in Schwangerschaft und Stillzeit ergeben. Ergebnisse experimenteller Untersuchungen liegen nicht vor. **Nebenwirkungen:** Keine bekannt; sollten welche auftreten, bitte behandelnden Arzt mitteilen.

Tropfen Dosierung 3 x tgl. 30 Tropfen (entspr. 900mg Weissdornextrakt als Tagesdosis) auf einem Teelöffel mit Zucker oder Brot (Diabetiker) oder unverdünnt einnehmen. Hinweis: Nicht mit Wasser einnehmen, um Trübung zu vermeiden. Vor Gebrauch schütteln. Haltbarkeit ungeöffnet: 3 Jahre

Filmtabletten Dosierung 2 x tgl. 1 Filmtablette (entspr. 900mg Weissdornextrakt als Tagesdosis) unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. Haltbarkeit unangebrochene Packung: 3 Jahre.

(*) NYHA: Internationale Klassifikation der Herzinsuffizienz durch *New York Heart Association*(NYHA/1994).

Packungsgrößen/ Tropfen 50 ml (N2) 100 ml (N3) Zul. Nr. 6575456.00.00

Tabletten 40 Tbl. (N2) ; 100 Tbl. (N3) ; erstattungsfähig

Stand: April 2003 (1)