



VIRUDERMIN® - Gel

- ist ein Adstringens zur Frühbehandlung von Herpeserkrankungen der Lippe und der angrenzenden Hautbezirke.
- **VIRUDERMIN® - Gel** hemmt die Virusvermehrung, wirkt austrocknend und dadurch schmerzlindernd.
- verhindert bei frühzeitiger Anwendung die Bildung schmerzhafter Bläschen. Es soll deshalb bei den ersten Anzeichen einer Herpesinfektion wie Kribbeln oder Spannungsgefühl an der Lippe angewendet werden.
- verhindert die Ausbreitung der Viren in benachbarte Hautzellen.
- **VIRUDERMIN® - Gel** wirkt nur lokal, so dass keine Nebenwirkungen im Körper zu befürchten sind und das Präparat auch während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden kann.
- **VIRUDERMIN® - Gel** entfaltet auch bei wiederholter Anwendung seine volle Wirksamkeit.

Die Erstinfektion mit dem Virus (Herpesvirus) erfolgt im frühen Kindesalter, meist ohne erkannt zu werden. Ein Organismus mit einem intakten Immunsystem kontrolliert die Viren durch Bildung von Virus-Antikörpern. Ist das Abwehrsystem jedoch infolge Erkältungskrankheiten, starker Sonneneinstrahlung -wie oft im Schnee oder am Meer - oder auch seelischem Stress geschwächt, kommt es zur explosionsartigen Virusvermehrung in den tieferen Gewebsschichten der Lippe und Grenzen der Schleimhäute. Die Bildung schmerzhafter Bläschen im Lippenbereich wird durch Herpesviren verursacht. Virudermin bewirkt eine Austrocknung und verhindert dadurch das Eindringen und Verbreiten in die benachbarten Hautzellen.

VIRUDERMIN® - Gel Wirkstoff: Zinksulfat. **Zusammensetzung:** 1 g Gel enthält: 10,0 mg Zinksulfat · 7 H₂O. Sonst. Bestandteile: Methylcellulose, Benzalkoniumchlorid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Als Adstringens* zur Frühbehandlung von Herpeserkrankungen der Lippe (Herpes labialis) und der angrenzenden Hautbezirke (Herpes perioralis). (* lat.: adstringere = zusammenziehen). **Gegenanzeigen:** Keine bekannt. **Nebenwirkungen:** Keine bekannt.

Dosierung u. Art der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, wird 3 bis zu 4 mal täglich eine kleine Menge des Gels dünn auf die betroffenen Stellen aufgetragen; sofort bei ersten Anzeichen wie Juckreiz, Schmerzen auf die betroffenen Stellen aufbringen!

Packungsgrößen: Gel Tube 5g. **Zul.- Nr. 990.00.00**

Stand der Information: September 2004 (II)